

# MARIMEX

bazénová chemie

5v1

## CHLOR KOMPLEX

CHLOROVÉ TABLETY VELKÉ

4,6 kg

1

REGULACE pH

2

DEZINFEKCE

3

ŘASY

4

VLOČOVÁNÍ

### Multifunkční přípravek k pravidelnému komplexnímu ošetření vody

**Vzhled a složení:** Dvouvrstvé modrobílé tablety s tmašími částicemi o hmotnosti 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je symklozén (kyselina trichlorisokyanurová) 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

**Působení:** Dezinfekční přípravek (typu 2) se používá pro komplexní průběžné ošetřování bazénové vody. Spojuje v jedné dávce 5 účinků potřebných pro správné ošetřování bazénové vody. Přípravek vodu dezinfikuje, likviduje řasy, vločky, zjišťuje a stabilizuje vápenatou tvrdost. Po ponoření tablety do vody dochází k jejímu postupnému rozpouštění, kdy se uvolňují všechny účinné složky. Pozor! Přípravek nesnižuje vápenatou tvrdost, ale stabilizuje ji, a tak omezuje tvorbu vodního kamene.

**Návod k použití a dávkování:** Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pak proveďte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Start a Stabilizátorem Chloru. Podle teploty vody pak přidávejte každých 5–8 dnů 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 30 m<sup>3</sup> vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci volného chloru mezi 0,5–0,8 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 1,0 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chloru průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testy.

**Způsob aplikace:** Plavákem: do dávkovacího plaváku vložte potřebné množství tablet. Nechte plavák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVATEJTE TABLETY DO SBĚRAČE!

**NEBEZPEČÍ. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od odevů a jiných hořlavých materiálů. Zamezte vdechování prachu. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skladujte uzamčené.**

**Pokyny pro první pomoc: Při vdechnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Při styku s kůží:** Neprodleně svlékněte znečištěný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmутými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. **Při požití:** Okamžitě vypláchněte ústa a dejte vypít 2-5 l vody (ne více, aby nemohlo dojít ke zvracení). NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Zajistěte co nejrychlejší lékařské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

**Skladování:** Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobře větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyslejších a oxidujících látek nebo rozpouštědel. Chraňte před sluncem.

**Nepříznivé vedlejší účinky:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokryma rukama. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Obsah balení:** 23 kusů 200 gramových tablet

**Doba použitelnosti:** Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Likvidace:** Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odezdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

**Datum výroby:** Uvedený na obalu. Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Obsah: 4,6 kg



11301604

2419.110718.01

Distributor:

MARIMEX CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz  
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz



MARIMEX

www.marimex.cz  
www.marimex.sk

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK spol. s r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk  
Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk

### Multifunkčný prípravok k pravidelnému komplexnému ošetrovaniu vody

**Vzhled a složení:** Dvouvrstvé modrobílé tablety s tmašími částicemi o hmotností 200 g pomalu rozpustné vo vode. Účinnou látkou je symklozén (kyselina trichlorisokyanurová) 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

**Působení:** Dezinfekčný prípravok (typu 2) sa používa na komplexné priebežné ošetrovanie bazénovej vody. Spája v jednej dávke 5 účinkov potrebných na správne ošetrovanie bazénovej vody. Prípravok vodu dezinfikuje, likviduje riasy, vločky, ziskuje a stabilizuje vápenatú tvrdosť. Po ponorení tablety do vody dochádza k jej postupnému rozpusteniu, keď sa uvoľňujú všetky účinné zložky. Pozor! Prípravok nesnižuje vápenatú tvrdosť, ale stabilizuje ju, a tak obmedzuje tvorbu vodného kamňa.

**Návod na použitie a dávkovanie:** Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Potom spravte ošetrovanie bazénovej vody rychlorozpustným chlorovým prípravkom Start a Stabilizátorom Chloru. Podľa teploty vody potom pridávejte každých 5–8 dní 1 až 2 tablety tohto prípravku na 30 m<sup>3</sup> vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Všeobecne platí, že na dosiahnutie křišťálovo čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah volného chloru udržiavaný v rozmedzí 0,3–0,6 mg/l, pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentráciu volného chloru medzi 0,5–0,8 mg/l. Ak klesne obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je potreba dodať chlor, pokiaľ je vyšší ako 1,0 mg/l, bazén nepoužívajte, obmedzte dodávku chloru a vyčkejte, až táto hodnota klesne do výšky uvedeného rozmedzia. Hodnotu obsahu chloru priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testami.

**Způsob aplikace:** Plavákem: do dávkovacieho plaváku vložte potrebné množstvo tablet. Nechajte plavák, aby sa voľne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody. Dávkovačom vstavaným do cirkulačného potrubia: do dávkovača dajte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁDZAJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVATEJTE TABLETY DO ZBERAČA!

**NEBEZPEČENSTVO. Pri kontakte s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor). Může prispieť k rozvoju požiaru; oxidáčne činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Může spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosahu detí. Uchovávejte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskiev, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neľahčite. Uchovávejte mimo odevov a iných hořlavých materiálov. Zabráňte vdechovaniu prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávejte uzamknuté.**

**Pokyny pre prvú pomoc: Po vdýchnutí:** Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Volejte lekára. **Po styku s kožou:** Neodkladne vyzlečte znečistený odev a umyte kožu vodou a mýdlom. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára. **Po zasažení očí:** Ihned začnite vyplachovať oči s otvorenými viečkami a vybranými kontaktnými šoškovkami pod tekúcou vodou najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekárske starostlivosť. **Po požití:** Okamžitě vypláchněte ústa a dajte vypít 2-5 l vody (nie viac, aby nemohlo dôjsť k zvracaniu). NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Zaisťte čo najrychlejšie lekárske ošetrovanie. Okamžitě volejte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. (tel. NTIC 02 5477 4166).

**Skladovanie:** Prípravok skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale v chlade a suchu pri teplotách do 50 °C na dobre vetranom mieste, oddelene od potravin, nápojov a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyslejších a oxidujúcich látok alebo rozpúšťadiel. Chraňte pred slnkom.

**Nepříznivé vedlejší účinky:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobkami. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkajte sa prípravku mokrymi rukami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

**Obsah balenia:** 23 kusov 200 gramových tablet

**Doba použitelnosti:** Najmenej 3 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

**Likvidácia:** Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zvyškami odovdajte v zberní nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po dôkladnom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

**Datum výroby:** Uvedený na obale. Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA. Registračné číslo výrobu bio/2366/D/18/CCHLP



8 590517 984020